

Fokuseret spørgsmål -Tidlig opsporing KOL

PICO 1

Bør asymptomatiske rygere have foretaget spirometri i forbindelse med tilbud om rygestop ved konsultation i almen praksis

Tovholdere: Repræsentanter fra arbejdsgruppen (DSAM og DLS)

Baggrund for valg af spørgsmål: Kan man ved måling af lungefunktionen hos rygere uden (er)kendte lungesymptomer forbedre deres samlede forløb, ved at øge graden (succesraten) af rygestop?

Population (population)

Rygere¹ over 35 år der ikke har vedvarende lungesymptomer

Intervention

Spirometri efterfulgt af tilbud om rygestop

Subgruppe/stratificerede analyser (hvis mulige)

Spirometri efterfulgt af tilbud om rygestopkursus til alle med positivt test resultat (skal defineres nærmere)

Spirometri hvor man anvender begrebet lungealder og tilbud om rygestop

Rygestop målt subjektivt og objektivt

Spirometri hvor man anvender begrebet lungealder

Søgeord på engelsk:

Spirometri, smoking cessation, COPD, MRC, ...etc.

Comparison (sammenligning)

Ingen spirometri men tilbud om rygestop,

Outcomes	Tidsramme	Kritisk/Vigtigt
<i>Rygestop</i>	<i>Efter intervention</i>	<i>Kritisk</i>
<i>Rygestop</i>	<i>Efter længste follow-up (min 1 år)</i>	<i>Kritisk</i>
<i>Overdiagnostik (antal ekstra KOL diagnose fratrasket patienter der har fået gavn af diagnosen)</i>	<i>Efter længste follow-up (min 5 år)</i>	<i>Kritisk</i>
<i>Underdiagnostik (antal ny diagnosticerede med KOL, der har fået gavn af diagnosen)</i>	<i>Efter længste follow-up (min 5 år)</i>	<i>Vigtig</i>
<i>Dødelighed</i>	<i>Efter længste follow-up (min 5 år?)</i>	<i>Vigtig</i>
<i>Sygelighed</i>	<i>Vigtig</i>	<i>Vigtig</i>
<i>Deltagelse i rygestopkursus</i>	<i>Efter intervention</i>	<i>Vigtig</i>
<i>Deltagelse i rygestopkursus</i>	<i>Efter længste follow-up (min 1 år)</i>	<i>Vigtig</i>
<i>Igangsættelse af medicinsk behandling</i>	<i>Efter intervention</i>	<i>Vigtig</i>
<i>Igangsættelse af medicinsk behandling</i>	<i>Efter længste follow-up (min 1 år)</i>	<i>Vigtig</i>
<i>Livskvalitet</i>	<i>Efter intervention</i>	<i>Vigtig</i>
<i>Livskvalitet</i>	<i>Efter længste follow-up (min 1 år)</i>	<i>Vigtig</i>

¹ Ryger = Dagligrygere? Storrygere? Pakkeår? andet?

Fokuseret spørgsmål -Tidlig opsporing KOL

<i>Skadevirkninger</i>	<i>Efter intervention</i>	<i>Vigtigt</i>
<i>Ændringer af sygdomsstadie(stadier skal defineres) Udregninger skal defineres på forhånd)</i>	<i>Efter længste follow-up (min 5 år)</i>	<i>Vigtigt</i>
<i>Funktionsevne (for upræcist, skal defineres)</i>	<i>Efter intervention</i>	<i>Vigtig</i>
<i>Funktionsevne (for upræcist, skal defineres)</i>	<i>Efter længste follow-up (min 1 år)</i>	<i>Vigtig</i>
<i>Leveår som patient</i>	<i>Efter længste follow-up (min 5 år)</i>	<i>Vigtigt</i>