

Hvordan foregår vaccinationen?

Når du bliver vaccineret, foregår det hos din egen læge. Efter vaccinationen skal du sidde i venteværelset i 15 til 20 minutter. Så kan lægen være sikker på, at du ikke bliver dårlig bagefter. Du skal vaccineres tre gange inden for et år, for at vaccinen virker.

1. Besøg. Ring og aftal en tid hos din læge – allerede nu.
2. Besøg. Sker ca. 2 måneder efter det første besøg.
3. Besøg. Sker ca. 4 måneder efter det andet besøg.



Hvem kan få HPV-vaccinationen gratis?

- Er du pige født i 1996 eller senere, kan du blive vaccineret gratis fra d. 1. januar 2009. Tilbuddet er en del af det almindelige børnevaccinationsprogram. Du skal være fyldt 12 år, og tilbuddet gælder, til du er fyldt 15 år.
- Er du pige født i 1993, 1994 eller 1995, kan du blive vaccineret gratis fra d. 1. oktober 2008 til udgangen af 2010.

Læs mere om HPV-vaccination, livmoderhalskræft, kønsvorter m.m. på:

www.StopHPV.dk

Sundhedsstyrelsen
Islands Brygge 67
2300 København S
Telefon 72 22 74 00
cff@sst.dk



pas godt på dig selv

Gratis HPV-vaccination mod livmoderhalskræft

Godt at vide, når du skal vaccineres

2008 www.manipulation.as



pas godt på dig selv

Nu kan du blive vaccineret gratis, når du er fyldt 12 år

Nu kan alle piger, der er født i 1996 og senere, blive vaccineret gratis mod et virus, der kaldes HPV. Det er et virus, som kan give kræft i livmoderhalsen, når man bliver voksen. Tilbuddet gælder fra den 1. januar 2009. Du kan blive vaccineret, indtil du er fyldt 15 år.

Specialtilbud til piger født i 1993, 1994 og 1995

Som et særligt tilbud kan piger, der er født i 1993, 1994 og 1995, også blive vaccineret gratis. Tilbuddet starter den 1. oktober 2008 og gælder til udgangen af 2010. Men der er ingen grund til at vente så længe.

Hvad er HPV-virus?

HPV-virus er et meget almindeligt virus, især blandt unge. Man bliver nemt smittet, når man har sex med en person, der har virus. Hos de fleste forsvinder infektionen af sig selv igen. Hos nogle bliver virus dog ved med at være der og kan give celleforandringer, som senere i livet kan udvikle sig til livmoderhalskræft.

Når du bliver vaccineret, mindsker du risikoen for at få livmoderhalskræft

Der findes mange typer af HPV-virus. Vaccinationen, som du nu kan få, beskytter mod de to typer, der er årsag til langt de fleste tilfælde af livmoderhalskræft. Den nye vaccination beskytter også mod flere andre slags kræft i kønsorganerne.

Når du bliver vaccineret, mindsker du også risikoen for at få kønsvorter

HPV kan give kønsvorter. Ligesom man kan have vorter på fingre og fødder, kan man få kønsvorter, der sidder på eller omkring kønsorganerne. Kønsvorter er ufarlige, men det kan være svært at komme af med dem igen. Vaccinen beskytter mod de to typer HPV, som er skyld i de fleste tilfælde af kønsvorter.

Man skal vaccineres, inden man bliver smittet

Vaccinen mod HPV virker kun, hvis man er vaccineret, før man bliver smittet. Derfor skal man vaccineres så tidligt som muligt, helst inden man begynder at have sex.

Bestil tid til din første HPV-vaccination

MFR-vaccination



Hvis du ikke har fået din MFR-vaccination mod mæslinger, fåresyge og røde hunde, kan du få den samtidig med HPV-vaccinationen.

Bivirkninger

Man kan få lidt ømhed, rødme og hævelse dér, hvor man bliver stukket, og nogle kan få lidt feber. I sjældne tilfælde ses overfølsomhedsreaktioner. Læs mere om bivirkningerne på www.StopHPV.dk.

Kondom mindsker risikoen for smitte

Selvom man bliver vaccineret, er det stadig vigtigt, at man beskytter sig med kondom, når man begynder at have sex. Kondom beskytter nemlig også mod andre seksuelt overførte sygdomme og uønsket graviditet.