

Hjælp os med at gøre opmærksom på tilbuddet om gratis pneumokokvaccination

Vaccinationen mod pneumokokker er blevet gratis for alle, der er fyldt 65 år, børn med visse kroniske sygdomme og visse andre borgere, som er i særlig risiko. Vaccinationstilbuddet skal sikre, at færre personer i særlig risiko bliver syge af pneumokokker.

For at bidrage til, at flest mulige personer i målgruppen bliver vaccineret mod pneumokokker, har Sundhedsstyrelsen lanceret en oplysningskampagne, der skal gøre borgerne opmærksomme på vaccinationstilbuddet.

Derfor finder du med denne sending vacciner også to plakater og 20 foldere om vaccinations-tilbuddet. Vi håber, at I vil hjælpe med at gøre opmærksom på tilbuddet ved at hænge plakaterne op og fordele folderne i jeres lokaler. Derudover opfordrer vi alle praktiserende læger til at gøre opmærksom på vaccinationstilbuddet i deres daglige konsultation med patienter i målgruppen.

Jeres støtte og bidrag til at sprede budskabet om vaccinationstilbuddet er afgørende for, at vi kan beskytte samfundets mest sårbare borgere bedst muligt under COVID-19.

Du kan finde mere information om vaccinationstilbuddet, vaccinen og de målgrupper, som er omfattet af tilbuddet på sst.dk/pv.

Du kan læse mere om de faglige overvejelser bag tilrettelæggelsen af programmet på bagsiden af dette brev og i Månedsblandet for Rationel Farmakoterapi nr. 6, 2020: sst.dk/da/Udgivelser/2020/Rationel-Farmakoterapi-6-2020

Du kan også læse mere hos Statens Serum Institut: ssi.dk/vaccinationer/risikogrupper/invasiv-pneumokoksygdom

Tak for jeres hjælp med at udbrede kendskabet til vaccinationstilbuddet.

Med venlig hilsen

Sigrid Paulsen

Sektionsleder, Evidens, Uddannelse og Beredskab
Sundhedsstyrelsen

Fakta om det gratis tilbud om pneumokokvaccination

Den 15. juni blev pneumokokvaccinen gratis for alle, der er fyldt 65 år. Dermed er følgende grupper omfattet af tilbuddet om gratis pneumokokvaccination:

- Alle personer, der er fyldt 65 år
- Beboere på plejehjem, bosteder og i plejeboliger
- Børn under 18 år med visse kroniske sygdomme
- Personer med visse alvorlige sygdomme

Du kan læse mere om målgrupperne og vaccinen på: sst.dk/pv

Om pneumokokvaccinationsprogrammet

- Infektion med pneumokokker er en hyppig årsag til lungebetændelse hos voksne og kan føre til invasiv pneumokoksygdom (fx blodforgiftning og/eller meningitis).
- Risikofaktorer for invasiv pneumokoksygdom omfatter bl.a. høj alder, kronisk sygdom og medfødt eller erhvervet immundefekt. Pneumokokvaccination kan forebygge infektion hos personer med øget risiko.
- Forekomsten af invasiv pneumokoksygdom er høj hos personer, der er fyldt 65 år med ca. 460 tilfælde om året, og med ca. 87 tilfælde om året hos personer under 65 år i risikogrupper (opgjort i perioden 2018-19).
- Baggrunden for valget af den 23-valente vaccine til programmet til personer i øget risiko er, at effekten af at vaccinere risikogrupper med den 13-valente er blevet mindre i takt med, at det i stigende grad er andre pneumokoktyper end dem, som er indeholdt i den 13-valente vaccine, som cirkulerer i befolkningen og forårsager alvorlig sygdom. Det skyldes, at den 13-valente vaccine benyttes i det danske børnevaccinationsprogram, og at befolkningen derigennem er beskyttet mod disse typer.
- Den 23-valente vaccine kan forebygge cirka 74 % af tilfældene af invasiv pneumokoksygdom hos personer i øget risiko (gennemsnitligt for 2017-2019).
- Effektiviteten af vaccination med den 23-valente vaccine hos personer, som er fyldt 65 år, er blandt andet blevet undersøgt i et større studie fra England og Wales. Studiet viste, at effektiviteten af den 23-valente vaccine til forebyggelse mod invasiv pneumokoksygdom var 41% i de første to år efter vaccination, 34% efter 2-4 år og 23% efter 5 år. Ud over tid efter vaccination afhænger effektiviteten også af andre faktorer såsom alder og underliggende sygdom hos de vaccinerede.
- Vaccination med den 23-valente pneumokokvaccination bør som udgangspunkt kun tilbydes til personer, som ikke tidligere er vaccineret med den inden for de sidste 6 år. Det skyldes, at risikoen for lokale reaktioner på injektionsstedet og systemiske bivirkninger øges, og at der er mistanke om, at immunresponsen bliver lavere end det primære respons, hvis der revaccineres på et tidligere tidspunkt.
- Hvis der er indikation for at revaccinere inden for 6 år (fx ved særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom eller mistanke om utilstrækkeligt immunologisk respons), bør dette forudgås af anti-stofmåling.