

HJERTEFLIMMER OG HJERTEMAGNYL®



Hjertemagnyl® kan give alvorlige blødninger,
hvis du også tager Marevan®

Er du i behandling med warfarin for hjerteflimmer?

Omkring 100.000 danskere lider af hjerteflimmer (atrieflimren) og hvert år diagnosticeres mellem 15.000-20.000 nye patienter. Risikoen for hjerteflimmer stiger i takt med alderen og omkring 10% af ældre over 75 år lider af hjerteflimmer.

Denne folder er til dig, der lider af hjerteflimmer og som er i behandling med warfarin (Marevan®, Waran®, Warfarin "Orion").

Hjerteflimmer kan give blodpropper

Når man har hjerteflimmer, bliver blodet ikke pumpet rigtigt fra hjertets forkamre til hovedkamre. Blodet i forkamrene står mere stille, og der kan dannes klumper af størknet blod i hjertet.

Hjerteflimmer kan være farlig, fordi klumperne i blodet kan vandre fra hjertet ud i kroppen. Her kan de sætte sig fast i blodkarrene og give blodpropper, blandt andet i hjernen. Hjerteflimmer er årsag til hvert femte tilfælde af blodpropper i hjernen. De kaldes også apopleksi eller slagtilfælde.

Hjertemagnyl® indeholder acetylsalicylsyre. Hjerdyl® og Magnyl® indeholder også acetylsalicylsyre og derfor gælder samme anbefalinger, hvis du tager et af disse lægemidler.

Blodfortyndende medicin beskytter mod blodpropper

For at nedsætte risikoen for blodpropper bliver patienter med hjerteflimmer behandlet med blodfortyndende medicin.

Den blodfortyndende medicin gør, at blodet har sværere ved at størkne. Det betyder, at det ikke klumper og danner blodpropper helt så let. Det er vigtigt, at doseringen af den blodfortyndende medicin er korrekt for at få den bedste beskyttelse mod blodpropper. For høje doser af blodtyndende medicin kan medføre alvorlige blødninger. For lidt medicin betyder, at du ikke bliver beskyttet mod blodpropper.

Hjertemagnyl øger risikoen for blødninger

Nogle patienter tager også Hjertemagnyl®, når de er i behandling med warfarin. Men bliver du allerede behandlet med warfarin giver behandling med Hjertemagnyl® ikke ekstra beskyttelse. Til gengæld stiger din risiko for blødninger. Det kan være mindre blødninger i tandkødet eller fra næsen og alvorlige blødninger i mave-tarm kanalen og hjerneblødninger. Blødninger som i værste fald kan være livsfarlige.

Følg dit hjerte - ned til lægen

På grund af den forøgede risiko for blødninger, anbefales Hjertemagnyl® ikke til patienter med hjerteflimmer, som samtidig er i behandling med warfarin. Der er dog undtagelser, hvor man skal fortsætte med at tage både Hjertemagnyl® og warfarin.

Husk altid at fortælle din læge om den medicin, du tager – også den du køber i håndkøb.

Tal med din med din læge, før du stopper med at tage Hjertemagnyl®.



Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF)

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Læs mere på www.irf.dk

Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF) er en del af Sundhedsstyrelsen. IRF arbejder for at fremme rationel farmakoterapi og forbedre uhensigtsmæssige ordinationsvaner gennem afbalanceret information om den lægemiddelbehandling, som giver den største effekt, de færreste og mindst alvorlige bivirkninger til den lavest mulige behandlingspris.