



## Indgang til pakkeforløb for brystkræft

Til brug i almen praksis

### Håndtering af symptomer på brystkræft

Ved ét eller flere af nedenstående symptomer og fund henvises til pakkeforløb for brystkræft:

- Palpatorisk suspekt tumor (hård, irregulært afgrænset og fikseret til omgivende væv, hus eller fascie. Enhver nyopdaget tumor hos postmenopausale kvinder opfattes som suspekt)
- Nytilkommen papilretraktion
- Nytilkommen hudindtrækning
- Papil-areolaeksem/ulceration (obs. Mb. Paget)
- Klinisk suspekterede aksillære lymfeknuder
- Billeddiagnostisk suspekt forandring (eks. fund ved mammografiscreening eller privat praktiserende radiolog)
- Biopsi-verificerede aksilmetastaser

→Vær særlig opmærksom på gravide og ammende med ovenstående symptomer.

→Vær særlig opmærksom på, at patienter med palpatorisk benign tumor, hævede aksillære lymfeknuder uden kendt årsag og blodig eller serøs sekretion, som ikke opfylder ovenstående kriterier for henvisning til pakkeforløb, skal henvises til klinisk mammografi.

### Kriterier for henvisning til pakkeforløb

Det er almen praksis' ansvar at henvise til pakkeforløb, hvis ikke anden årsag til ovenstående symptomer og fund kan bekræftes.

### Håndtering af recidiv og nyt tilfælde af brystkræft

- I opfølgingsperioden: Henvis til opfølgende afdeling ved symptomer på recidiv.
- Efter opfølgingsperioden: Henvis til nyt pakkeforløb for brystkræft.

Se mere herom i pakkeforløb for brystkræft.

### Link til relevant information

Sundhedsstyrelsens [Pakkeforløb for brystkræft](#)

Sundhedsstyrelsens læsevejledning: [Om kræftpakkeforløb og opfølgingsprogrammer; begreber, forløbstider og monitorering](#)

Sundhedsstyrelsens [Patientinformation vedrørende pakkeforløb for brystkræft](#)

Sundhedsstyrelsens [Anbefalinger for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom](#)

Sundhedsstyrelsens [Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft](#)

Sundhedsstyrelsens [Anbefalinger for den palliative indsats](#)

DSAM's [Kræftopfølgning i almen praksis](#)

DBCG's [kliniske retningslinjer](#)