

Opioid score skema: Observationsskema til vurdering af påvirkethed ved opioidindtag

Score	Øjne	Motorik/bevægelse	Kommunikation/tale	Adfærdseksempler
1	Åbne	Upåfaldende, vanlige kropsholdning og bevægelsesmønster	Svarer adækvat på tiltale. Normal tale. Orienteret	Reagerer som almindeligvis, vågen og klar.
2	Øjnene er åbne, øjenlåg åbnes/lukkes langsommere end normalt	Normale kropsbevægelser, måske lidt langsommere end normalt	Svarer adækvat. Lidt langsom i talen orienteret i tid, sted og egne data	Lettere intoksikeret. Fremstår "træt". Brugeren kan rejse sig.
3	Øjnene er lukkede, åbnes ved tiltale	Tydeligt langsommere bevægelser	Svarer adækvat. Langsom i talen. Orienteret i tid, sted og egne data	Vil gerne ligge ned, siddende stilling er ubekvem. Tvivlsomt om brugeren kan rejse sig
4	Øjnene forbliver lukkede ved tiltale eller holdes kortvarigt åbne	Tydeligt langsommere bevægelser. Synker sammen i benene. Tydeligt nedsat finmotorik. Cyanose kan forekomme	Svarer adækvat Snøvlende tale Orienteringsevnen er nedsat	Kan ikke orienterer sig i rummet. Kan ikke skille sig af med injektionsudstyr på forsvarligvis.
5	Øjnene forbliver lukkede ved tiltale	Ukoordineret grovmotorik Udsættende vejrtrækning/nedsat vejrtrækningsfrekvens, Vejrtrækning på opfordring Cyanose kan forekomme	Svarer ikke adækvat på tiltale. Stammende. Snøvlende tale Nedsat orienteringsevne	Kan falde ned fra stolen, lægger hovedet på bordet eller i skødet. Forstår ikke en besked og talen kan være uforståelig.
6	Ingen reaktion på tiltale	Ingen spontane bevægelser. Respirationsinsufficiens	Ingen svarer komatøs	Bevidstløs, iværksæt beredskab, naloxone, HLR, tilkald 112.