

Til:

Region Hovedstaden  
Region Midtjylland  
Region Nordjylland  
Region Sjælland  
Region Syddanmark  
Danske Regioner

9. januar 2021

## Vedr. fordeling og prioritering af vaccineleverancer

Sagsnr. 05-0600-309/  
Reference SIFP

I næste uge modtages 60 pakker á 1.170 doser vaccine (i alt 70.200 doser) Corminarty® samt 50 pakker á 100 doser (i alt 5.000 doser) af Covid-19 Vaccine Moderna®. Leverancerne skal fortsat fordeles pro rata efter befolkningstal til de fem regioner samt Færøerne og Grønland, idet pakkerne dog ikke skal deles, hvorfor afrunding vil forekomme.

Fordelingerne fremgår nedenfor:

| <b>Corminarty®</b><br>(pakker á 975 hhv. 1.170 doser) | Uge 52 | Uge 53 | Uge 1 | Uge 2 |
|---|--------|--------|-------|-------|
| Modtaget på SSI                                       | 10     | 39     | 49    | 60    |
| Fordelt til sygehusapoteker                           | 10     | 39     | 49    | 60    |
| Region Nordjylland                                    | 1      | 5      | 5     | 6     |
| Region Midtjylland                                    | 2      | 8      | 11    | 13    |
| Region Syddanmark                                     | 2      | 8      | 10    | 12    |
| Region Sjælland                                       | 2      | 5      | 7     | 8     |
| Region Hovedstaden                                    | 3      | 11     | 16    | 19    |
| Færøerne  | 0      | 1      | 0     | 1     |
| Grønland  | 0      | 1      | 0     | 1     |

| <b>Covid-19 Vaccine Moderna®</b><br>(pakker á 100 doser) | Uge 2 |
|--|-------|
| Modtaget på SSI  | 50    |
| Fordelt til sygehusapoteker                              | 50    |
| Region Syddanmark  | 50    |

Produktresumé for Cominarty® af 8. januar 2021 ændrer antal doser pr. ampul fra 5 til 6, hvorfor antal doser pr. pakke vil være 1.170 fra uge 2.

Da første leverance af Covid-19 Vaccine Moderna® er meget begrænset, skal denne sending allokere til én region. Det er aftalt, at Region Syddanmark indsamler erfaring med håndtering af denne vaccine. Samtidig tilbageholdes halvdelen af sendingen for at sikre vaccine til andet stik.

Grundlaget for prioriteringen er fortsat Sundhedsstyrelsens ”Retningslinje for håndtering af vaccination mod COVID-19”. Der henvises desuden til tidligere meddelelser af 22., 26., 29. og 30. december 2020.

Det følger heraf, at der på nuværende tidspunkt er igangsat vaccination af hele eller dele af følgende målgrupper:

| Målgrupper  | Estimat<br>(antal personer)                       |
|---|---|
| Gruppe 1: Personer som bor i plejebolig mv.   | 46.000  |
| Gruppe 2: Personer med alder $\geq$ 65 år som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp | 50.000  |
| Gruppe 4: Personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren                    | 71.000 af 353.500                                 |
| Gruppe 5: Udvalgte patienter > 65 med særligt øget risiko                                     | Målrettet 5.000 af 30.000 (skønnet i alt 190.000) |
| Gruppe 6: Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko                             | 6.000   |
| I alt   | 178.000   |

Der henvises i øvrigt til Sundhedsstyrelsens ’vaccinationskalender’, som løbende vil blive opdateret og kan tilgås på: [sst.dk/da/udgivelser/2021/vaccinationskalender](https://sst.dk/da/udgivelser/2021/vaccinationskalender)

Pr. 8. januar er der registreret første vaccination af 102.092 personer.

Vaccination med leverancer i uge 2 skal fortsat anvendes til første vaccination blandt ovenstående udmeldte målgrupper som en opsamling inden for disse grupper, hvor der er personer, som endnu ikke er vaccineret.

Ved dimensionering af invitationer kan tages udgangspunkt i en udnyttelsesgrad på 100% for Cominarty® og på 90% for Covid-19 Vaccine Moderna® samt en tilslutning på 90% til første stik. Sundhedsstyrelsen har i den forbindelse justeret estimater baseret på de første erfaringer, som bl.a. har vist, at der ofte kan udhentes op til 7 doser pr. ampul Cominarty®, som opvejer et eventuelt spild. Da der endnu ikke er danske erfaringer med håndtering af Covid-19 Vaccine Moderna® er spildet konservativt estimeret til 10%.

For næste uges leverancer af Cominarty® kan der således allokeres vaccinationer til 67.860 personer og for Covid-19 Vaccine Moderna® til 2.250 personer. Hvis udnyttelsesgraden viser sig at være højere, skal vacciner selvfølgelig tilbydes til yderligere personer i målgrupperne.

Efter drøftelser med regioner og kommuner finder Sundhedsstyrelsen behov for at præcisere følgende vedr. målgruppe 4 og 5:

Vedrørende målgruppe 4 finder Sundhedsstyrelsen, at prioritering skal følge disse principper, der kan vurderes og sammenvejes fx på afdelings- eller afsnitsniveau:

- Hvor udsat personen er for smitte med ny coronavirus. Smitterisikoen er fx høj ved tæt kontakt med helt uvisiterede patienter eller patienter med mistænkt eller bekræftet COVID-19, medium ved tæt kontakt med visiterede patienter, lav når der kan holdes afstand og ikke relevant, når der ikke er patientkontakt.
- Konsekvenserne, hvis den ansatte smitter sin patient/klient. Risikoen er fx høj, hvis den ansatte har tæt kontakt med personer i særligt øget risiko, men lav, hvis den ansatte alene har kontakt med personer, som ikke kan forventes at blive særligt syge ved smitte, fx unge og raske.
- Konsekvenser for arbejdsfunktionen, hvis den ansatte smittes og har fravær. Risikoen er fx høj, hvis den ansatte har en særligt specialiseret funktion og ikke umiddelbart kan erstattes.

Ansatte, som vurderes med høj risiko på alle parametre, skal prioriteres højt med hensyn til vaccination, mens ansatte, som har lav eller ingen risiko på én eller flere parametre skal prioriteres lavere afhængigt af, hvilken parameter der er tale om.

Som eksempel kan nævnes en intensivsygeplejerske, som passer svært syge COVID-19-patienter og derfor selv er i høj risiko for smitte samtidigt med, at konsekvenserne, hvis vedkommende smitter andre svært syge patienter uden COVID-19, er høj, og at konsekvenserne ved fravær er store, da der varetages specialiserede funktioner. Intensivsygeplejersken skal derfor prioriteres meget højt.

En hjemmesygeplejerske kan også, ud fra en konkret vurdering, være i høj risiko for at blive smittet, og konsekvenserne, hvis vedkommende smitter sin patient er høj, mens konsekvenserne for fravær er moderat. Vedkommende skal derfor prioriteres højt.

En tandplejer, som behandler unge mennesker kan være i høj risiko for at blive smittet, men konsekvenserne, hvis vedkommende smitter sin patient og for fravær er mindre. Vedkommende skal derfor prioriteres lavere.

Vedrørende målgruppe 5 finder Sundhedsstyrelsen grund til at præcisere, at målgruppen omfatter mennesker, der udover somatiske sygdomme/tilstande, også har psykiatriske lidelser og/eller kognitive funktionsevnedssættelser.

Det er kendetegnende, at en del af disse personer vil være tilknyttet botilbud og derigennem kan identificeres og vaccineres sikkert og effektivt. Det drejer sig om botilbud efter serviceloven § 108, som er længerevarende botilbud til mennesker med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne med omfattende behov for hjælp til såvel daglige funktioner samt

pleje, omsorg eller behandling - samt boliger til samme målgruppe efter almenboligloven § 105<sup>1</sup> kombineret med servicelovens § 85-støtte.

---

<sup>1</sup> Omfatter ikke almene ældreboliger