

Er du færdigvaccineret med vaccinen fra AstraZeneca?

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du nu bliver revaccineret med en mRNA-vaccine mod COVID-19, hvis du har modtaget to stik med vaccinen fra AstraZeneca.

Læs denne pjece, inden du bliver vaccineret.



27. oktober 2021



Hvorfor bliver jeg tilbudt revaccination med en mRNA-vaccine?

Sundhedsstyrelsen vurderer, at du vil have gavn af at blive vaccineret mod COVID-19 igen. Ved at blive vaccineret med et 3. stik får du en bedre og formodentlig også en længerevarende beskyttelse mod COVID-19.

Vaccinerne mod COVID-19 er yderst effektive. De forebygger smitte, alvorlig sygdom og indlæggelse med COVID-19. For de fleste giver vaccinerne en god beskyttelse 6 måneder efter, at de er færdigvaccineret.

Vaccinernes beskyttende effekt falder dog hos alle vaccinerede med tiden, og for nogle personer sker det hurtigere end for andre. Hvis man har høj alder, hvis det er lang tid siden, at man er blevet vaccineret, og hvis man har kroniske sygdomme, kan den beskyttelse, man har fået fra vaccinen, aftage hurtigere. Derfor anbefaler vi, at du tager imod tilbuddet om revaccination.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du bliver revaccineret, når du får en invitation og gerne inden, at der er gået 9 måneder. Det gør vi for at sikre, at du fortsat har høj beskyttelse af vaccinen.

Det er gratis at blive vaccineret, og det er frivilligt, om du vil tage imod tilbuddet.

Det skal du vide, inden du bliver vaccineret

Du bliver tilbudt et 3. stik med en mRNA-vaccine fra Pfizer-BioNTech. Vaccinen er meget sikker og effektiv.

Inden du bliver vaccineret, skal du vide, at det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) ikke har godkendt, at personer, som tidligere er færdigvaccineret med vaccinen fra AstraZeneca, modtager et 3. stik med en mRNA-vaccine mod COVID-19.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at der ikke vil være risiko for alvorlige bivirkninger ved et 3. stik med en mRNA-vaccine, når du tidligere har modtaget to stik med vaccinen fra AstraZeneca.

Ligesom første gang du blev vaccineret, kan du opleve almindelige bivirkninger, fx ømhed ved indstiksstedet, træthed, muskelsmerter, hovedpine og feber. Det kan ikke udelukkes, at bivirkningerne kan være værre ved 3. stik.

Hvordan bestiller jeg tid til revaccination?

Du vil automatisk modtage en invitation til revaccination i din e-Boks, når der er gået 6 måneder og 2 uger siden, at du blev færdigvaccineret. Du bestiller tid til revaccination ved at logge på www.vacciner.dk med dit NemID. Her kan du se ledige tider, og hvor i landet du kan blive revaccineret.

Hvis du er fritaget for digital post, vil du modtage et brev med posten, og du kan bestille tid ved at ringe til den regionale hotline.



Hvordan foregår min revaccination?


Revaccination foregår ligesom sidste gang, du blev vaccineret.



1. Mød op på vaccinationsstedet på det aftalte tidspunkt. Husk at have dit gule sundhedskort med.



2. Forskellige sundhedspersoner kan give vaccinen, men de arbejder altid under en læges ansvar.



3. De fleste bliver vaccineret i en muskel i skulderen.



4. Du skal vente 15 minutter på vaccinationsstedet, så du kan få hjælp, hvis du får en allergisk reaktion. Det sker dog meget sjældent.

Kan jeg få bivirkninger ved revaccination?

Alle vacciner har bivirkninger, og det gælder også vaccinerne mod COVID-19. Det er dog ikke alle, som bliver ramt af bivirkninger. Der vil mest være tale om milde bivirkninger, som hurtigt går over igen. Det kan være feber eller ømhed dér, hvor du er blevet stukket. Ved revaccination kan du opleve, at de almindelige bivirkninger bliver lidt værre, end ved dine tidligere vaccinationer.

Eksempler på almindelige bivirkninger

Lokale reaktioner

- Smerter og rødme på indstiksstedet

Generelle reaktioner

- Træthed
- Hovedpine
- Muskel- og ledsmerter
- Kulderystelser
- Let temperaturstigning

Eksempler på sjældne bivirkninger

- Svære allergiske reaktioner
- Vejrtrækningsbesvær
- Hududslæt
- Hævelser i ansigtet



I sjældne tilfælde kan der ses svære allergiske straksreaktioner, som kommer umiddelbart efter, at du er blevet vaccineret. Har du en svær allergi mod f.eks. lægemidler, skal du være opmærksom på dette, inden du bliver vaccineret. I forbindelse med vaccination mod COVID-19 vil der altid være sundhedspersonale klar til at hjælpe.

Du bør kontakte din læge, hvis du oplever alvorlige symptomer, efter du er blevet revaccineret. Det kan f.eks. være allergiske symptomer som vejrtrækningsbesvær eller hududslæt. Lægen kan vurdere, om symptomerne skyldes vaccinen og igangsætte behandling, hvis du har brug for det. Lægen har pligt til at indberette formodede bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen. Du kan også selv indberette formodede bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen via www.lmst.dk.

Hvis du oplever velkendte og forbigående symptomer efter vaccination, behøver du ikke kontakte læge.

Der er lidt forskel på, hvilke bivirkninger og reaktioner der er mest hyppige ved de forskellige vacciner. Du kan læse mere på www.sst.dk/covid-vaccination.

Det er fortsat vigtigt at forebygge smitte

Selvom du er revaccineret med et tredje stik, er der stadig en risiko for, at du kan bære smitte videre til andre. Derfor er det vigtigt, du stadig følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger for at mindske smitte:



Hvor kan jeg finde svar på flere spørgsmål?

Du kan altid finde den nyeste information om vaccination mod COVID-19 på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk/covid-vaccination. Her kan du også læse mere om ny coronavirus og COVID-19 på www.sst.dk/corona eller om andre vaccinationstilbud, fx influenza på www.sst.dk/da/influenza.

