

17. december 2021

Mulighed for fremrykning af 3. stik covid-19-vaccine til 18-39 årige i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19

Langt de fleste vaccinerede personer under 40 år har ikke en øget risiko for et alvorligt forløb, hvis de bliver smittet med SARS-CoV-2. Personer i alderen 18-39 år vil som udgangspunkt blive tilbudt 3. stik 165 dage (ca. 5½ måneder) efter 2. stik. Sundhedsstyrelsen vurderer, at det kan være hensigtsmæssigt at give mulighed for at fremrykke 3. stik til 140 dage efter 2. stik for enkelte personer mellem 18-39 år, som er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19.

Vurdering og ordination

- Fremskyndet revaccination kan ordineres af behandlende læge. Borgeren kan selv henvende sig til behandlende læge eller lægen kan opfordre til tidlig revaccination.
- Fremskyndet revaccination er uden for godkendelsesgrundlaget og den ordinerende læge bør opveje den mulige lille risiko for bivirkninger, fx myokarditis, mod den mulige gavnlige effekt ved at fremrykke 3. stik.
- Vurderingen kan tage udgangspunkt i nedenstående sygdomme og tilstande.

Sygdomme og tilstande, som kan give anledning til at overveje fremrykning af 3. stik covid-19 vaccine

- Gravide.
- Andre personer, som er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19.
- Personer, som, pga. bekymring for smitte med SARS-CoV-2 eller covid-19 sygdom, har svært ved at opretholde en normal hverdag, er socialt isoleret og har nedsat trivsel.

Eksempler på sygdomme og tilstande som kan give anledning til at overveje fremrykning af 3. stik: (Jf. Sundhedsstyrelsens notat. "Personer med øget risiko ved covid-19").

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Gravide• Kronisk nyresvigt• Dårligt reguleret diabetes• Alvorlig hjertesygdom• Svær lungesygdom• Alvorlig kronisk leversygdom eller korttarmssyndrom• Kræft i nylig eller aktuel behandling eller metastatisk kræftsygdom | <ul style="list-style-type: none">• Neurologisk sygdom med betydende funktionsnedsættelse• Svær psykisk sygdom, særligt svær skizofreni• Downs syndrom• BMI over 35 hhv. BMI over 30 og samtidig kronisk sygdom• Social udsatte, inklusiv personer med et misbrug, hjemløse og psykisk syge med multisygdom |
|---|---|

Sikkerhed og information til patienten

- Comirnaty® og Spikevax® er godkendt til revaccination 6 måneder efter 2. dosis. Fremrykket vaccination med et 3. stik foregår således uden for godkendelsesgrundlaget og der påhviler den ordinerende læge skærpet informations- og journalføringspligt jf. [Retningslinje for håndtering af vaccination mod covid-19](#).

Risiko for myokardit

- Der er en øget risiko for myokarditis (hjertemuskelbetændelse) og perikarditis (hjertehindebetændelse) efter vaccination med Comirnaty® eller Spikevax®. Den anslåede forekomst er <1/10.000 vaccinerede, sv.t. en meget sjælden bivirkning.
- Risikoen for myokarditis og perikarditis efter 3. stik er endnu ikke beskrevet.
- Tilstandene findes overvejende hos personer under 40 år med den største forekomst blandt yngre mænd.
- Om der er en øget risiko blandt personer under 40 år ved et forkortet interval mellem 2. og 3. stik er ikke kendt.

Reaktogenicitet

- Reaktogeniciteten (som fx lokal reaktion på indstiksstedet, feber, influenzalignende symptomer, muskel- og ledsmerter mv.) er sammenlignelig efter 2. og 3. stik covid-19-vaccine.
- Lymfadenopati (lymfeknudesvulst) forekommer lidt hyppigere efter 3. stik end efter 2. stik
- En forkortelse af intervallet mellem 2. og 3. stik vil teoretisk set øge reaktogeniciteten, særligt for yngre aldersgrupper. Erfaringer fra Israel viser dog, at bivirkningsprofilen efter 3. stik er tilsvarende den efter 2. stik ved et interval på 5 måneder.

Oprettelse i DDV

- Fremrykket revaccination kan ordineres af den behandlende læge eller dennes medhjælp i almen praksis, speciallægepraksis eller på sygehusafdeling.
- Den ordinerende læge kan selv oprette og registrere vaccination i Det Danske Vaccinationsregister (DDV), samt journalføre i eget system.
- Er der ikke mulighed for at vaccinere på stedet, kan ordinerende læge oprette vaccinationen i DDV og vaccinationen kan udføres andetsteds.
- [Retningslinje for håndtering af vaccination mod covid-19](#).

For mere information se Sundhedsstyrelsens notat *Vedr. mulighed for fremskyndet 3. dosis covid-19 vaccine til 18-39-årige med en øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19*.