

10. januar 2023



Om tablet- behandling mod covid-19

Få svar på nogle af de spørgsmål, du kan have om
tabletbehandlingen mod covid-19.

For at være i målgruppen for behandling skal du:

- Være testet positiv for covid-19 med PCR-test eller en antigen test (hjemmetest)
- Være i øget risiko for alvorligt sygdomsforløb med covid-19*
- Have symptomer på covid-19 og have haft symptomerne i højst 5 dage

Hvis du kan nikke genkendende til alle tre punkter, er du muligvis i målgruppen
for at kunne få tidlig behandling.

** Læs mere i pjecen.*

Om tidlig behandling

Der findes forskellige typer af tidlige behandlinger mod covid-19, som alle har til formål at nedsætte risikoen for et alvorligt sygdomsforløb. Behandlingerne gives til personer der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb. Høj alder, kroniske sygdomme og graviditet er nogle af de tilstande, der øger risikoen, specielt hvis du ikke er vaccineret.

Hvem kan være i målgruppen for tidlig behandling mod covid-19?

1. Positiv test for covid-19

Det kan være en positiv PCR-test, hurtigtest eller selvtest.

1. Symptomer på covid-19

Du skal have væsentlige symptomer på covid-19, og de må maksimalt have varet 5 dage, før du er i målgruppen for behandling.

2. I øget risiko for alvorligt forløb med covid-19 i en af følgende grupper:

- a. Du er 80 år eller ældre og er vaccineret for mere end 6 måneder siden.
- b. Du er 80 år eller ældre og har en eller flere kroniske sygdomme eller tilstande*, uanset din vaccinationsstatus.
- c. Du er 65-79 år og uvaccineret.
- d. Du er 65-79 år, har en eller flere kroniske sygdomme eller tilstande* og er vaccineret for mere end 6 måneder siden.
- e. Du er 50-64 år, har en eller flere kroniske sygdomme eller tilstande* og er uvaccineret.
- f. Du er gravid og er i øget risiko, for eksempel pga. kroniske sygdomme, og du ikke er vaccineret. Det er din egen læge, som vurderer, om du er i øget risiko.

* Kroniske sygdomme eller tilstande kan for eksempel være: kronisk nyresvigt, svær lungesygdom, alvorlig kronisk leversygdom, alvorlig hjertesygdom, kræft, dårligt reguleret sukkersyge, er overvægtig, alvorlig neurologisk sygdom, svær psykisk sygdom, nedsat immunforsvar.

Der kan være forskel i kriterierne for de forskellige typer af behandlinger.

Hvordan får jeg tidlig behandling mod covid-19?

Hvis du tænker, at du kan være i målgruppen for tidlig behandling, er det vigtigt, at du kontakter din praktiserende læge hurtigst muligt efter du er konstateret smittet. Din læge kan vurdere, om du kan tilbydes tidlig behandling enten direkte fra almen praksis eller via en infektionsmedicinsk afdeling.

Behandlingen skal gives kort tid efter, at du har fået symptomer på covid-19 for at have effekt.

Hvordan foregår behandlingen?

Ved nogle af behandlingerne kan du få en recept ved din praktiserende læge. Andre behandlinger gives på sygehus.

Det anbefales, at du følger Sundhedsstyrelsens gode råd ved sygdom om at blive hjemme, når du har symptomer på sygdom. Du kan for eksempel få en pårørende til at hente behandlingen til dig, eller du kan få den bragt ud fra apoteket.