



# Kræft i øjne og orbita – børn med retinoblastom

Oversigt over indgang til pakkeforløb – til brug i almen praksis

## Mistanke om retinoblastom hos børn

Mistanke om retinoblastom hos børn opstår ved:

- Tilfælde af retinoblastom i nærmeste familie (forældre og søskende)
- Hvid pupil (leucocori)
- Skelen som i sjældne tilfælde skyldes retinoblastom (disse børn erkendes hos en praktiserende speciallæge i øjensygdomme ved undersøgelse for skelen)

Hvis patienten henvender sig hos almen praksis, skal almen praksis ved *mistanke* henvise akut til en privatpraktiserende speciallæge i øjensygdomme eller eventuelt til en øjenafdeling med hovedfunktion (filterfunktion).

## Filterfunktion – hos praktiserende speciallæge eller øjenafdeling med hovedfunktion

I nogle tilfælde vil den praktiserende speciallæge i øjensygdomme have begrundet mistanke om retinoblastom og henvise til pakkeforløbet, men oftest er det ikke muligt i praksis at undersøge børnene, og de vil blive henvist til undersøgelse på øjenafdeling med hovedfunktion, hvorfra barnet henvises til pakkeforløbet ved begrundet mistanke om retinoblastom.

## Begrundet mistanke – kriterier for henvisning til pakkeforløb

Begrundet mistanke om retinoblastom hos børn opstår ved:

- Tumor i øjet uden anden sikker diagnose eller mistanke om tumor i øjet
- Inflammation i øjet, buftalmi eller blødning i øjet, hvor retinoblastom kan mistænkes som tilgrundliggende årsag

## Henvisning til pakkeforløb

Ved begrundet mistanke om retinoblastom skal patienten henvises akut til vagthavende læge på den højt specialiserede øjenafdeling. Det bør fremgå af henvisningen, at der er begrundet mistanke om retinoblastom. Det skal af henvisningen tydeligt fremgå, hvilke af ovenstående symptomer eller fund der udløser den begrundede mistanke om retinoblastom.

## Kommunikation

Den henvisende læge drøfter følgende med patienten og evt. pårørende:

- Tilbud om henvisning til pakkeforløb med henblik på undersøgelse for retinoblastom
- Næste trin i undersøgelsen
- Hvor og hvornår undersøgelsen vil ske

Patienten skal efter samtalen give samtykke til videre udredning i pakkeforløb.

## Forekomst

Der diagnosticeres årligt 3 nye tilfælde af retinoblastom hos børn og unge under 15 år (Dansk Børne Cancer Register).

## Risikogrupper

Børn af forældre, der har haft retinoblastom, har en større risiko for at få sygdommen end andre, hvorfor der tilbydes screeningsundersøgelser de første leveår. Den teoretiske risiko kan nedbringes ved genetisk testning af forælderen, der har haft retinoblastom.

## Link til pakkeforløb – Kræft hos børn:

<https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/kræft/pakkeforloeb/~media/546C7379704342A5AF69D709F3B8D211.ashx>