

VIGTIG MEDDELELSE TIL ALLE BLODDONORER OM VIRUSSMITTE MED BLOD

Skal læses før blodgivning (se underskriftserklæring)

Du må ikke give blod, hvis du:

- har mistanke om, at du kan være smittet med HIV eller leverbetændelse

Eller hvis du inden for de sidste 6 måneder:

- har haft seksuel kontakt med en person, der har været udsat for smitte på en af de måder, der er nævnt i pjecen
- har haft samleje med en person, som er smittet med HIV eller er smittebærer af hepatitis
- har haft samleje med en person fra geografiske områder, hvor HIV eller hepatitis B forekommer udbredt i befolkningen Dette gælder for hele Asien, Syd- og Mellemamerika og hele Afrika
- er blevet piercet eller tatoveret

Du må ikke give blod, hvis du på et tidspunkt i dit liv:

- som mand har haft seksuel kontakt med en anden mand
- er eller har været prostitueret
- er eller har været stiknarkoman
- deler eller har delt injektionsnål med andre
- har været behandlet for blødersygdom før 1988

HER KAN DU FÅ TELEFONISK ANONYM RÅDGIVNING

KØBENHAVN

Aids-Linien

Telefon 33 91 11 19

hverdage kl. 9.00-23.00, lørdag, søndag og helligdage kl. 11.00-18.00

AIDS-Linien tilbyder chat- og email-rådgivning via www.aids-linien.dk

FYN

Center for Sex og Samfund

Telefon 63 14 28 14

mandag-fredag kl. 9.00-22.00, lørdag-søndag kl. 16.00-22.00

Layout: Sundhedsstyrelsen. Foto: Mikael Rieck. Tryk: Datagraf

www.sst.dk

Sundhedsstyrelsen

Islands Brygge 67

2300 København S.

Tlf. 72 22 74 00

Fax 72 22 74 11

sst@sst.dk

 Sundhedsstyrelsen



BLODDONORER, AIDS OG LEVERBETÆNDELSE

2005

VIGTIG MEDDELELSE TIL BLODDONORER

Denne pjece kan bestilles hos Schultz Information på tlf. 7026 2636, samt downloades fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Hvilke virus kan smitte med blod

De tre vigtigste er HIV (human immundefekt virus) samt to forskellige virus, der medfører leverbetændelse (hepatitis B og hepatitis C).

Hvilke sygdomme forårsager de?

HIV er et virus, der ødelægger kroppens modstandskraft (immunforsvar) mod infektioner. Hvis man ikke bliver behandlet, udvikles AIDS, som er en yderst alvorlig sygdom. Man kan være smittet med HIV i flere år og føle sig rask, men man kan alligevel smitte.

Hvordan smitter HIV?

- HIV smitter:
- ved samleje med en HIV-smittet person
 - ved overførsel af smittet blod, fx ved brug af samme kanyler eller sprøjte i forbindelse med stiknarkomani eller injektion af bodybuilder steroider eller hormoner
 - fra smittet mor til barn ved fødslen

HIV smitter ikke ved almindelig social kontakt (i hjemmet, i skolen, på arbejdspladsen). Du kan ikke blive smittet ved at give blod, da blodbankerne anvender sterilt éngangsudstyr, herunder éngangskanyler.

Hepatitis B

Denne form for leverbetændelse fremkommer nogle måneder efter smitten, og den kan vise sig ved let feber, kvalme, madlede, gulsot, mørk urin og lys afføring. Leverbetændelsen kan vare en måneds tid. Sygdommen kan forløbe helt uden symptomer. Hos nogle heler betændelsen ikke fuldstændig op men fortsætter i en blivende smittebærertilstand, hvor man fortsat kan smitte.

Hvordan smitter hepatitis B?

Sygdommen smitter ganske som HIV ved seksuel kontakt, blodoverførsel og fra mor til barn ved fødslen.

Hepatitis C

Oftest forløber hepatitis C uden sygdomstegn. I de fleste tilfælde udvikles herefter en blivende smittebærertilstand uden symptomer, hvor man fortsat kan smitte.

Hvordan smitter hepatitis C

Sygdommen smitter langt overvejende ved blodoverførsel, fx ved at man har delt kanyler, piercingværktøj, tatoveringsnål eller akupunktur med andre.

Du kan være smittet med HIV eller med hepatitis, hvis du

- deler eller har delt injektionsnåle med andre (fx ved stiknarkomani eller injektion i forbindelse med bodybuilding)
- er blevet piercet, tatoveret eller har fået akupunktur med værktøj, der ikke er ordentligt rengjort
- har fået blødermedicin før 1988

eller har haft risikofyldt seksuel adfærd, dvs.:

- som mand har haft samleje med en anden mand
- som kvinde har haft samleje med biseksuel mand
- er eller har været prostitueret
- har haft samleje med en prostitueret
- har haft samleje med en stiknarkoman
- har haft samleje med en person fra geografiske områder, hvor HIV eller hepatitis forekommer udbredt i befolkningen. Dette gælder for hele Asien, Syd- og Mellemamerika og hele Afrika
- har haft samleje med en person, som er smittet med HIV eller er bærer af hepatitis B
- har haft samleje med en person, der har været behandlet med blødermedicin før 1988

De forholdsregler myndighederne har iværksat er:

1. Oplysning til alle donorer om adfærd der indebærer øget risiko for smitte og dermed forbud mod bloddonation (denne folder samt donorspørgeskemaet). Donor skriver under på, at de oplysninger, som donor har afgivet, efter den pågældendes bedste overbevisning er korrekte.

2. Hver enkelt portion donorblod bliver undersøgt for smitte med HIV, hepatitis B og hepatitis C. Hvis der konstateres smitte, vil du blive underrettet og få tilbud om undersøgelse og rådgivning. Det smittede blod kasseres.

3. De blodprodukter, der anvendes til behandling af blødere og andre patienter, bliver desuden varmebehandlet, eller virus uskadelliggøres på anden måde. Disse metoder kan ikke bruges til donorblod, som skal anvendes ved transfusioner.

Er undersøgelserne af donorblod for virusssmitte 100% sikre?

Nej! Smitte kan først påvises 1-3 måneder efter den er pådraget. Det er derfor uhyre vigtigt, at personer, der har været udsat for smitterisiko, undlader at give blod. Er du det mindste i tvivl, bør du under alle omstændigheder undlade at give blod. Tag en snak i fuld fortrolighed – evt. telefonisk med blodbankens læge (eller din egen læge) om, hvordan du bedst kan få afklaret din tvivl.

Lad være med at give blod for at undersøge, om du er smittet!

Undersøgelse inden bloddonation er ikke en garanti for, at blodet ikke kan smitte, da smitten ikke kan afsløres i den første tid efter smittetidspunktet. I denne periode kan blodet overføre de alvorlige sygdomme ved transfusion og dermed udsætte patienterne for smitte.

Tilbage melding til Blodbanken i året efter en bloddonation

Hvis du i året efter en bloddonation udvikler tegn på – eller får konstateret – HIV-smitte eller leverbetændelse, bør du kontakte blodbanken så snart som muligt - gerne telefonisk - og i *fuld fortrolighed* oplyse blodbankens læge herom.

Undersøgelse for HIV

Hvis du ønsker at blive undersøgt for HIV, kan dette ske hos en praktiserende læge eller på en af følgende klinikker, som har specialiseret sig i denne opgave. Her kan du også få råd og vejledning. Undersøgelsen kan ske anonymt og er gratis. Lægehenvi sning eller tidsbestilling er ikke nødvendig.

HIV-KLINIKKER

KØBENHAVN

Bispebjerg Hospital
Venereaklinikken
Telefon 35 31 31 80
Bispebjerg Bakke 23, indgang 4, afd. D
2400 København NV
Åbningstid mandag-torsdag 8.30-18.30, fredag 8.30-14.00

Rigshospitalet
Afd. M, ambulatorium 5112
Telefon 35 45 51 12
Blegdamsvej 9, opgang 51 C,1
2100 København Ø
Åbningstid mandag-torsdag 8.00-14.30, fredag 8.00-13.30

Gentofte Amtssygehus
Hudambulatoriet
Telefon 39 77 31 88
Niels Andersensvej 65, opgang 15, st.
2900 Hellerup
Åbningstid mandag-fredag 9.00-12.00, tirsdag og torsdag tillige 16.00-17.00

Hvidovre Hospital
Afsnit 144, infektionsmedicinsk ambulatorium
Telefon 36 32 30 16
Kettegård Alle 30
2650 Hvidovre
Åbningstid mandag-fredag 9.00-14.00

SJÆLLAND

Helsingør Sygehus
Infektionsmedicinsk ambulatorium
Telefon 48 29 67 62
Esrumvej 145, plan 3
2000 Helsingør
Åbningstid mandag, tirsdag og torsdag 8.00-14.00, onsdag 12.00-18.00, fredag lukket

Amtssygehuset i Roskilde
Klinisk biokemisk afdeling
Telefon 47 32 56 00
Køgevej 7, indgang 15-16
4000 Roskilde
Åbningstid mandag-fredag 7.30-13.00, torsdag 7.00-18.00

Centralsygehuset i Næstved
Medicinsk ambulatorium
Telefon 55 72 14 01, lokal 3992
Ringstedgade 61
4700 Næstved
Åbningstid mandag-torsdag 8.00-14.30, fredag 8.00-13.00

Holbæk Sygehus
Klinisk biokemisk afsnit
Telefon 59 48 43 77
Smedelundsgade 60
4300 Holbæk
Åbningstid mandag-fredag 8.00-13.00

Centralsygehuset i Nykøbing Falster
Centrallaboratoriet
Telefon 54 88 57 00
Fjordvej 15
4800 Nykøbing F
Åbningstid mandag-fredag 7.45-14.00

BORNHOLM

Centralsygehuset
Centrallaboratoriet
Telefon 56 95 11 65, lokal 9150
Ullasvej 8
3700 Rønne
Åbningstid mandag-fredag 8.00-12.00

FYN

Odense Universitetshospital
C amb. 2
Telefon 65 41 26 55
Kløvervænget 4, stuen, bygning 16
5000 Odense C
Åbningstid mandag-fredag 8.00-13.30

Odense Universitetshospital
Ambulatoriet for hud- og kønssygdomme
Telefon 65 41 27 05
Sdr. Boulevard 29, bygning 12
5000 Odense C
Åbningstid tirsdag og torsdag 16.00-17.00

JYLLAND

Sygehus Vendsyssel, Frederikshavn
Klinisk biokemisk afdeling
Telefon 99 22 57 00
Barfredsvej 83
9900 Frederikshavn
Åbningstid mandag-fredag 8.00-14.30

Aalborg Sygehus Syd
Afdeling D3, infektionsmedicinsk ambulatorium
Telefon 99 32 23 53
Hobrovej 16-18
9000 Aalborg S
Åbningstid mandag-fredag 8.00-14.00

Hudklinikken, Århus
Telefon 89 49 18 61
P.P. Ørumsgade 11
8000 Århus C
Åbningstid mandag, onsdag til fredag 8.00-8.30, tirsdag 15.00-16.30

Skejby Sygehus, Århus
Infektionsmedicinsk ambulatorium Q
Telefon 89 49 83 52
Brændstrupsgårdsvej, bygning 1
8200 Århus N
Åbningstid mandag-fredag 8.00-12.00

Herning Centralsygehus
Medicinsk ambulatorium
Telefon 99 27 20 00
Gl. Landevej 61
7400 Herning
Åbningstid mandag-fredag 7.30-13.30